




多肉饕餮—热爱一切美好


多肉植物种类介绍



阿楹



















 Sanaimain
Mai, 2013

【子持莲华】









虎刺梅



雷神



金手指



仙人掌



昙花



仙人球



生石花



宝石花



蟹爪兰



虹之玉



碰碰香



燕子掌



熊童子



金琥




星美人




令箭荷花



黑法师




玉扇



子持莲华



雅乐之舞



玉蝶



火祭



黄丽



桃美人



佛甲草



鹿角海棠



麒麟掌



姬星美人



八宝景天



不夜城芦荟



八千代




宝草




垂盆草



珍珠吊兰



碧光环



乙女心



假昙花



姬玉露



锦晃星



小球玫瑰




吉娃莲



冬美人



蓝石莲



紫珍珠



薄雪万年草



量天尺



千佛手



姬胧月



筒叶花月



绯花玉



虹之玉锦



姬秋丽



条纹十二卷




大和锦



子宝



玉翁




五十铃玉



金边龙舌兰



玉吊钟



月兔耳



金虎仙人球



茜之塔



龙骨柱



山影拳



特玉莲



霜之朝



短叶虎尾兰



爱之蔓



仙人柱



乌羽玉



青星美人



红稚莲




球松



枝干番杏



马齿苋树



小人祭




金钱木



雷童



莲花掌




秋丽




丽娜莲



多肉观音莲



若歌诗



铭月





多肉植物原产地图片、视频欣赏





多肉植物养殖技术

花盆的选择

：花盆有泥盆、瓷盆、紫砂盆、塑料盆、木盆等，坚强的肉肉几乎适合任何一种材质的花盆，但要想养好肉肉，则需要针对不同材质的花盆，做好一些准备工作。

瓦盆最大的优点是透气且便宜，有利于植物根系生长；缺点：美观度较差，太透气土壤十分容易干，烈日暴晒下，盆边沿的要系容易受伤害，保水能力不强。
(红陶盆与瓦盆差不多)



瓷盆：外形漂亮，但不太透气，需要解决透气问题，中小瓷盆可用饮料瓶剪掉上半部，只用下半部分，周身打孔，倒扣在漏水孔上就可以了。



紫砂盆：漂亮、透气性介于瓦盆和瓷盆之间。选购的时候需要注意盆壁的薄厚，壁薄的紫砂盆透气性越强，盆壁厚的紫砂盆可以采用与瓷盆同样的办法解决透气问题。



木盆：透气、排水性较好，但需要注意防腐和生虫，以免影响植物根系正常生长和遭虫害。不过多肉植物一般是要多晒太阳的，浇水也不会太湿。



需要注意的是，多肉植物中，越是大株，所消耗的水分和养分相对小株越少，盆土过多不但没有用，而且容易导致腐烂。所以说容器是否透气，是给肉肉们选择花盆时最重要的一个标准。

给多肉植物 配土的要求：

介质的好坏，直接影响到大部分多肉植物的生长，配出理想的介质，一般要达到五点要求：1、一定要疏松透气；2、一定要排水良好；3、一要保水性适中；4、根据植物不同习性针对性增加一定量的含有腐殖质成份的物质；5、尽量最大能力化的利用手中现有的材料，因地制宜，就地取材。




一般比较好的透水材料：1、粗砂：一般需要经过筛选、淘洗，河边就可以找到；2、可以买到的材料：植金石、兰石、轻石、火山石等，花市都有卖，但价格高；3、珍珠岩：花市有卖，缺点是过轻，浇水时容易瓢浮；4、煤渣：非常不错的材料，农贸市场小摊处都有，但需要筛选，透水功能特别好，缺点晴天干得太快，阴雨天干得太慢，所以需要掺和一些别的介质来中和这种情况。



苗苗配土的方法：

方法一：泥炭土+珍珠岩（1：1）珍珠岩时间长会粉碎，阻碍植物根系呼吸，一般2年换一次土。

方法二：泥炭土60%+沙子20%+颗粒20%，颗粒可以是珍珠岩、火山岩、蜂窝煤、陶粒、石子等。



成年老株配土方法：

配土方法差不多，只是把沙子和颗粒的比例加大一点。

方法一：泥炭土+沙子+颗粒1：1：1。


方法二：泥炭土10% - 20%+沙子20%+颗粒60% - 80%。颗粒增多后，水分流失较快，肉肉吸收能力下降，就会消耗自己的叶片来供应养分，这进修最底层的叶片就会慢慢干枯脱落掉，时间一长自己就长成小树桩了。

养植要点：

1、多肉植物的生长期与休眠期：春秋季节是多肉植物的生长期，夏冬季节为休眠期，但是又因地域及气候条件，某些地区夏季与冬季也是可以生长的。比如：夏季开空调，冬季北方地区有暖气，都可以使多肉植物继续生长。

2、全日照指的是日照时间，表示某些多肉植物可以全天接受日照，并不是指的完全放在阳光下沐浴，夏季还是需要采取一些防晒措施的（防晒网）。

3、多肉植物适宜生长的温度：对于多肉植物来说，最适宜的生长温度是 10°C - 30°C 。夏季超过 35°C 时，部分多肉植物会进入休眠状态，特别是“冬种型”（冬季生长），当温度达到 40°C 时，几乎所有的多肉植物都会进入休眠状态，即使“夏种型”（夏季生长），也会进入休眠状态（不再吸收水分）。冬季在低于 5°C 时，部分多肉植物会进入休眠状态。 0°C 是冰点，水分会慢慢结冰，多肉植物叶片和枝干内部大部分都是水分，所以当低于 0°C 时，多肉植物内部的水分也会慢慢结冰，植物主体肯定都不会再生长了，这时候就一定要断水。



4、夏季断水：夏季断水其实也只是针对部分多肉植物而言，植物总还是需要水分的，所以在夏季高温时，浇水间隔延长至一月一次，少量最佳。多少让土壤中保持一丁点的水分。野外中生存的多肉植物在夏季也是依靠地上土壤中的水分度夏，所以可以持续几个月甚至半年不用雨水也能存活。但是现在把多肉植物移种到家里，红陶一类的花器很容易就会完全干透，在夏季继续保持一周甚至5天浇水一次。持续时间主要看天气与温度状况，发现秋季来临，温度开始慢慢降低就可以加大浇水量了。

5多肉植物混栽：多肉植物混栽组合起来效果更美，不同颜色的肉肉搭配在一起看起来更漂亮。养护方面正常日照、浇水即可，但是要特别注意一点：混栽组合多肉植物尽量选择同一科属栽种，因为习性大致相同，所以管理起来也比较方便。例如：石莲花一类混植、景天属一类混植、也可以将景天属与石莲花属一起混植，因为都同属于景天科。不过番杏科和景天科混植在一起就不太好了，因为番杏对水比较敏感，时间长了就会发现，还得挖出来重新搭配。

6、施肥时要注意的要点：

根茎外有损伤和有虫害的肉肉
切记不可施肥；

新培育的叶插苗和播种苗，尽
量不要施肥；

自己配置的肥类，没有发酵腐
熟前一定不要用，有臭味不说还会
加速肉肉的死亡；

不要含有盐分的骨头汤、肉汤
还有牛奶、蛋清、菜叶等等这些当
做肥料来用；

夏天不要施肥；

茶根切记不可当做肥料来用；

尽量选用缓释肥，省时又省力；



7、多肉植物病虫害的防治：

红蜘蛛：被害叶出现黄褐色斑痕或枯黄脱落，这种瘢痕永留不褪，一般来说可以看看叶背面是不是有蜘蛛网，还有很小的红色、白色、暗色的虫子，防治手段可以通过加大环境温度，减少和避免蔓延，可以用阿维菌素。

介壳虫：吸食茎叶汁液，导致生长不良，严重时出现枯萎死亡；数量少时，可用毛刷驱除，杀虫药，或在培养土中混以一定量的呋喃丹可以起一定的预防作用。




根粉蚧：

根粉蚧在植物根部常出现外被蜡绵状物，体覆白色蜡粉的小虫危害。可造成盆花长势衰弱，叶色萎黄，甚至整株植物枯死。土壤消毒或用杀虫剂，如护花神。



4、腐烂处理：通常是由浇水过多或养殖环境过于湿润而引起的真菌感染，有些虫子比如粉蚧也会引起腐烂，尤其是根粉蚧，这些害虫吸食植物汁液造成的伤口会引起真菌感染。腐烂的形式很多，而且当发现的时候往往已经晚了，要时刻警惕植物上褪色的区域，以及变软、变糊状的茎和叶子，一旦发现，但是烂了，要立刻切掉，并且刀具和人手前后都要消毒以免传染其他植株，切下后的植株要用杀菌剂喷植株，伤口必须完全干燥后才能入土。



叶插、扦插、分株：

多肉植物繁殖的几种方式。

叶插仅适用于景天科、独尾草科的部分品种以及其他某些特殊的品种。具体方法是将叶片完整掰下，并平放在稍微潮湿的土壤上，并保持湿润，依品种不同，叶片基部的生长点处会先后长出芽体繁殖。也有某些品种应将叶片半埋入土中，例如橙黄棒叶花。

扦插适用于大部分品种，包括小部分块根品种。将适当长度的枝条剪下，伤口处可用草木灰消毒，并把枝条插入潮湿的土壤中，依品种不同，可能在几个月内发根。

分株适用于所有能形成根部群生株的植物。直接用手或者雕刻刀将几棵根部生长在一起的植株轻轻分开或割断，每株应带有一定的根系。伤口处可用草木灰消毒。



叶插多肉：

叶片的重要性:可以直接把叶片插入土中,也可以让叶片平躺在土面,不过不管用哪种方法,影响成功率的最主要因素还是叶片本身.选择健康的叶片就代表成功率大大提升.根据品种不一样 , 叶插出根\出芽的时间和成功率也都会不一样.

土壤: 土壤可以用草木灰+蛭石,蛭石已经被列为育苗极品材质,特别利于生根.初期可以把草木灰弄湿润一些,叶片放入后就不要再浇水了 , 也不需要什么薄膜盖住保湿.阳光也需要~ 放在明亮通风的地方即可.


正常维护:一般在20-30天左右就能看见嫩芽.有一些品种会更慢一些,不要着急,如果两个月都没有出根出芽,或者叶片透明化,或者只出根不出芽,基本就宣布该叶片失败了。当叶片出现根须后可以将根部轻轻埋入土中,继续等待.直到嫩芽出现,再生长一周左右就可以移盆同其他成苗一样正常护理了。




扦插多肉

： 多肉植物徒长很常见，修剪插枝就给了多肉更多的繁殖机会，一株变两株甚至更多，单头变双头甚至多头就成为了可能。

一般修剪后的第一步是将剪枝放在阴凉外，让断口见干愈合2 - 3天；第二部把剪枝下端的叶片摘除（可以留作叶插），大概留出3厘米左右的茎，（多肉植物有的不适合修剪后立即摘除下端的叶片，因为水分太大，摘除叶片时很容易损伤叶根或是伤及至茎，而导致叶片无法进行叶插，另外茎伤在插枝时也容易腐烂，所以最好是两天后枝叶中的水分稍有流失后再作摘除）。





方法一：一是修剪两三天后立即栽种：剪枝的切口干爽愈合后，我们就可以插枝了。栽种之前最好先看好花器和剪枝的高度，决定好如何摆放，以免反复种植，栽种时尽量让裸茎全部没入介质中直到第一片叶片。这种栽种方式的前一周不需要浇水，之后喷湿盆土表面，见干后用同样的方法，再两周左右稍加大水量逐渐给水。这种栽种方法的优点是不会伤及根芽，但控水不好容易腐烂而导致扦插失败。

另一种可以等待剪枝生根后进行栽种，其实剪枝凭借空气中的湿度，15天左右就能生根。这里有一种方法，用一个小瓶将瓶壁喷湿，把剪枝架在上面，或者直接在里面装上少许的湿润的赤玉土，再放上剪枝，瓶内的相对湿度能很容易促进生根，这时栽种不会因为无根的情况下浇水而导致腐烂。但栽种时不小心会伤到新生根，一定注意。

多肉植物

临摹





缀化：

是指花卉中常见的畸形变异现象，属于植物形态的一种变异现象。缀化变异是指某些品种的多肉植物受到不明原因的外界刺激（浇水、日照、温度、药物、气候突变等），其顶端的生长锥异常分生、加倍，而形成许多小的生长点，而这些生长点横向发展连成一条线，最终长成扁平的扇形或鸡冠形带状体。缀化变异植株因形态奇异，观赏价值更高，又因其稀少，较原种（种植）更为珍贵。

锦：

常被称为“锦斑”，属于植物颜色上的一种变异现象，实为叶绿素减少或缺失的现象。锦斑变异是指植物体的茎、叶等部位发生颜色上的改变，如变成白、黄、红等各种颜色，大部分锦斑变异并不是整片颜色的变化，而是叶片或茎部，部分颜色的改变。相比原色来说，植物主体颜色种类更多，更具观赏性，因此也比较受欢迎。多肉植物的锦斑变异情况在植物界种也是非常常见的，引发植物锦斑变异主要是外界因素，也有遗传因素，浇水、日照、温度、药物、气候突变等都有可能造成多肉植物的锦斑化。



群生：

常指植物主体由多个生长点，生长出新的分枝与侧芽，并且共同生长在一起的状态。这个就很好理解啦~ 其实就是多肉植物密密麻麻的长在一起。造成这样的效果很简单，砍头、叶插、或者不管它，时间会慢慢让普通的多肉植物群生起来滴~ 一般来说最容易出现群生效果的方法是“扦插”（砍头）与“叶插”。经常叶插和扦插的朋友会知道，叶插的嫩芽发出来后，特别容易出多头。同样，扦插砍头后，原植株主体被砍掉的部分也会冒出很多新的嫩芽来。



老桩：

生长多年，拥有较多的木质化枝干的植株。




花箭：

从叶片中生长出长长的花茎，多肉植物景天类常是这种开花形式。

砍头：

一种修剪方式的通俗叫法，指用剪刀将多肉植物顶部剪掉，令其分化侧芽，达到群生效果







今天你肉肉了吗？

多肉植物盆栽DIY欢乐启动！



本广告仅供参考，因该之用。所有内容以相关部门最终批文及履行的合同为准。